



tableau 7 : rapport HAP/ VDSS (mg/Kg)

Sondages	Benzo(a) pyrene	Fluoranthene	Naphtalene	Benzo(a) anthracene	Benzo(k) fluoranthene	Chrysene	indeno(1,2,3- c,d)pyrene
VDSS	3,5	3050	23	7	450	5175	8
T3 (3,4 - 4 m)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
T4 (2 - 2,5 m)	0,03	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,03

tableau 8 : rapport HAP/ VCI (mg/Kg)

Sondages	Benzo(a) pyrene	Fluoranthene	Naphtalene	Benzo(a) anthracene	Benzo(k) fluoranthene	Chrysene	Indeno(1,2,3- c,d)pyrene
usage sensible	7	6100	46	13,9	900	10350	16,1
usage non sensible	25			252	2520	25200	252
VCI retenue	7	6100	46	13,9	900	10350	16,1
T3 (3,4 - 4 m)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T4 (2 - 2,5 m)	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,01

tableau 9 : rapport OHV/ VDSS (mg/Kg)

Sondages	cis-1,2- dichloroéthylène	chloroforme	1,1,1-trichloroéthane	1,2-dichloroéthane	trichloro- éthylène	tétrachloro- éthylène
VDSS	3		7,5	2	0,1	3
T2 (3,5-4,5 m)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
T3 (3,4-4 m)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
T6 (1-1,5 m)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,01
T6 (2,5-3,5 m)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00